

موارد مصرف هالامید

مقدار مصرف در یک لیتر آب	مورد	طریقه مصرف
۳ تا ۵ گرم	اتاق ها	کف اتاق ها با تی آغشته به هالامید تمیز شوند. دیوارها و دستگیره ها و همچنین تخت ها با دستمال آغشته به هالامید پاک شوند.
۳ تا ۵ گرم	آشپزخانه و سالن غذاخوری	تمام سطوح به خصوص سطوح داخل یخچالها و چرخهای حمل غذا (هنگام ورود و خروج از آشپزخانه) باید با محلول هالامید ضد عفونی شوند.
۳ تا ۵ گرم	سرویس های بهداشتی	دستشویی ها روزی ۲ بار و حمام ها، توالت ها و دوش های حمام پس از هر بار استفاده با محلول هالامید ضد عفونی گردند.
۵ گرم	لوازم مخصوص بیماران	لگن بستری بیماران را قبل از ۲۰۰ میلی لیتر محلول پر کنید. این کارسبب کاهش بوی نامطبوع می گردد. لیوان مخصوص خلط بیماران را به مدت یک ساعت با محلول پر کنید.
۳ تا ۵ گرم	وسایل اتاق عمل	تمام وسایل اتاق عمل باید به مدت نیم ساعت درون محلول هالامید قرار داده شوند. سپس استریلیزه شده و یا داخل دستگاه اتو کلاو قرار گیرند.
۱ گرم	وسایل نظافت	برس ها، جاروها و سایر وسایل نظافت را پس از استفاده به مدت یک شب و درون محلول قرار دهید.
۳ تا ۵ گرم	البسه آلوده	البسه بیماران به مدت ۱۲ ساعت درون محلول قرار گیرند. برای بیماران مسلول ۵ گرم و برای بیماران غیر مسلول ۳ گرم در ۱ لیتر آب استفاده شود.
۳ تا ۵ گرم	ملحفه و بالش ها	ابتدا به ماده ضد عفونی کننده هالامید آغشته و سپس صبر کنید تا در مجاورت هوا خشک شوند و یا از هالامید در زمان شستشو استفاده شود.
۳ تا ۵ گرم	کهنه های بچه	کهنه های اطفال باید ابتدا با محلول هالامید شستشو شده و در برابر هوا خشک شوند.
۳ تا ۵ گرم	چرخهای مخصوص شستشوی البسه	به هنگام ورود و خروج از بخش با هالامید ضد عفونی شوند.
۲ تا ۰/۵ گرم	ضد عفونی خون و چرک	ابتدا باید با پارچه ای که به محلول هالامید ۲۰ گرم در لیتر آغشته است لکه های خون و چرک که اطراف پاشیده می شود را تمیز کنید سپس پارچه دیگری را که آن هم آغشته به هالامید ۲۰ گرم در لیتر است به مدت ۲۰ دقیقه روی لکه قرار دهید، در نهایت محل مربوطه را با محلول ۲ تا ۵ گرم در لیتر ضد عفونی کنید.